

## Chapitre IV : Morphologie des organes végétaux

### 1/ Racine


La racine est la partie souterraine de la plante. Elle se dirige généralement vers le bas dans un **géotropisme positif** répondant ainsi à la gravité et fuit la lumière par un **phototropisme négatif**. Elle n'est pas chlorophyllienne et ne porte ni feuilles, ni bourgeons. Les principales fonctions des racines sont de maintenir la plante dans le sol et d'absorber l'eau et les sels minéraux. Elles ont un rôle dans le système conducteur d'une plante puisque les éléments nutritifs vont des racines à la tige puis aux feuilles. Cette morphologie de la racine se complique quand la plante se développe. Elle se ramifie et devient pivotante, fasciculée ou tubéreuse.

#### 1-1/ Types des racines

**1-1-1/ Racine pivotante** : caractérisée par une racine principale très développée (**pivot**) par rapport aux racines secondaires (ex : dicotylédone). Ce type de racine pénètre profondément dans le sol et fixe solidement la plante.

**1-1-2/ Racine fasciculée** : caractérisée par de nombreuses racines de la même importance, très ramifiée et dont on ne distingue pas la racine principale (ex : monocotylédone). Ce système racinaire permet à la plante de disposer d'une grande surface de contact avec l'eau et les minéraux et de s'ancrer solidement.

**1-1-3/ Racine tubérisée** : c'est une racine considérée comme un organe de réserve, son rôle principale est de stocker les réserves nutritives d'une plante (ex : betterave, radis...). La plante utilise ses réserves lorsqu'elle fleurit et produit des fruits.



**Figure** : Différents types des racines (A) pivotante (B) fasciculée (C) tubérisée

## **1-2/ Modifications des racines**

La classification précédente des racines correspond à la majorité des racines observées, mais quelques plantes cependant vivent sans racines apparentes comme le gui, d'autres plantes ont des racines spécialisées qui se modifient pour s'adapter à l'environnement dans lequel elles vivent. On peut trouver ainsi :

**1-2-1/ Racines adventives** : sont des racines qui apparaissent le long d'une tige souterraine ou aérienne qui servent souvent à la multiplication végétative et au bouturage des plantes (ex : stolon du fraisier)

**1-2-2/ Racines crampons** : sont des racines adventives qui se développent sur les tiges et qui assurent l'accrochage de la plante sur des surfaces verticales (ex : lierre)

**1-2-3/ Racines aériennes** : développées par les plantes épiphytes (plantes qui poussent en se servant d'autres plantes comme support) pour absorber l'humidité atmosphérique

**1-2-4/ Racines succulentes** : racines adaptées au stockage de l'eau

**1-2-5/ Racines échasses** : produites par le tronc ou par des branches, elles se développent à l'air libre avant de pénétrer le sol. Cette adaptation permet une meilleure assise et l'évaluation au dessus de l'eau.

**1-2-6/ Racines contreforts** : ce sont des excroissances latérales, situées à la base de certains arbres tropicaux qui permettent de stabiliser la plante dans les sols légers en apportant un support additionnel au tronc et permettant ainsi une meilleure fixation et une résistance au vent.

**1-2-7/ Pneumatophores** : racines spécialisées, telles que celles rencontrées chez les plantes de la mangrove, dont le rôle est respiratoire. Les pneumatophores alimentent en oxygène les plantes qui se développent dans les marécages où l'eau est très peu oxygénée.

**1-2-8/ Racines suçoirs** : observées chez les plantes parasites comme le gui




Figure 43 : Racines adventives




Figure 44 : Racines adventives fixatrices




Figure 45 : Racines adventives crampon




Figure 46 : Racines échasses




Figure 47 : Racines respiratoires (pneumatophores)




Figure 48 : Racines suçoirs

## 2/ Tige

Partie aérienne de la plante qui porte les feuilles, et au moment de la reproduction les organes reproducteurs. Elle se trouve dans le prolongement de la racine principale. La région de raccordement des deux organes (tige et racine) constitue le **collet**. La tige est caractérisée par un **phototropisme positif** et un **géotropisme négatif**.

La présence des feuilles est un caractère important de la tige, tout au long de laquelle elles sont insérées sur des renflements appelés : **nœuds** ; l'espace compris entre deux nœuds est un **entre nœud**. L'extrémité de la tige est recouverte par un **bourgeon terminal**, constitué par des ébauches foliaires et protégeant le méristème primaire apical. La croissance de la tige s'effectue grâce à l'activité du bourgeon terminal qui constitue simultanément la tige et les feuilles. A l'aisselle de chaque feuille se trouve un **bourgeon axillaire**.




Figure 19 : Morphologie d'une tige

Certains de ces bourgeons donneront des tiges secondaires : rameaux qui sont également terminés par un bourgeon terminal. Les bourgeons qui donneront des rameaux sont des **bourgeons végétatifs**, ceux qui donneront des fleurs sont les **bourgeons floraux**.

La tige est **herbacée** ; si elle est tendre, fragile et **annuelle** (ne vit qu'un an). Elle est **ligneuse** si elle est dure, solide et **vivace** (vit des années voire des siècles). Les **branches** et les **rameaux** que l'on distingue chez les arbres et les arbustes sont également des tiges. Ce sont des **ramifications** dont le **tronc** d'arbre est considéré comme une tige ligneuse principale de grande taille.

## **2-1/ Types des tiges**

L'adaptation de la tige dans un milieu influence considérablement la forme générale de la plante. La plupart des plantes sont **dressées**, quelques unes sont **rampantes** ou **grimpantes**. Beaucoup d'entre elles sont capables de modifier davantage leurs tiges et de les enfouir sous terre.

### **2-1-1/ Tiges aériennes**

La plupart des tiges aériennes sont **dressées** (axe principal dressé verticalement), certaines peuvent toutefois être **rampantes** (à croissance horizontale) et s'enraciner au niveau des nœuds, on parle alors de tiges **stolonifères** (tige adventive rampante dont le bourgeon terminal peut s'enraciner et donner naissance à un nouveau plant, ex : fraisier). Certaines tiges rampantes s'élèvent en utilisant des supports, elles s'y fixent à l'aide de vrilles, ou sont parfois munies de ventouses ou de crampons ou s'enroulent autour d'eux, on parle alors respectivement, de tiges **grimpantes** ou **volubiles**.

Les tiges creuses des graminées et des autres plantes proches sont appelées **chaume**

**Stipe** : un axe cylindrique non ramifié marqué par les cicatrices des bases des feuilles (palme tombées), il caractérise les Angiospermes Monocotylédones arborescentes.

**Cladodes et phylloclades** : sont des rameaux spécialisés ayant l'apparence d'une feuille et assurant les mêmes fonctions (photosynthèse, respiration et réserve). **Les cladodes** sont courts, aplatis et formés d'un seul entre nœud. **Les phylloclades** sont constitués de plusieurs entre nœuds aplatis.

**Tiges succulentes** sont des tiges qui ont la propriété de stocker l'eau dans un parenchyme aquifère pour s'adapter et survivre dans des milieux désertiques.

**Rameaux épineuse ou dards** : ce sont des rameaux caractérisés par une transformation de leur bourgeon terminal en dard (épine).


### **2-1-2/ Tiges souterraines**

Elles sont profondément modifiées par le milieu, elles ne sont jamais vertes mais d'une teinte semblable à celle de racines et portent des feuilles réduites à l'état d'**écailles** jaunâtres et des bourgeons souvent peu apparents. Leur ressemblance avec les racines leur vaut le nom de


**rhizome. Le tubercule** (tige tubérisée) est une tige souterraine gonflée de réserves et dont les entre nœuds sont plus proche que ceux du rhizome (ex : pomme de terre). **Le bulbe** est une tige souterraine courte (ex : oignon). **Les bulbilles** ressemblent à de petits bulbes (ex : ail)

**2-1-3/ Tiges aquatiques** : elles diffèrent des tiges aériennes par leur structure et peuvent demeurer entièrement ou partiellement submergées

**2-1-4/ Plantes acaules** : qualifient une plante ne possédant aucune tige apparente, dont la tige est si courte, que les feuilles semblent naître de la racine, les feuilles sont alors disposées en rosette à la base de la plante ex : laitue.



**Figure 20** : Stolon d'un fraisier



**Figure 21** : tige grimpante (volubile)



Figure 22 : Stipe du palmier dattier




Figure 23 : Chaume des graminées




Figure 24 : Bulbe d'oignon




Figure 25 : bulbilles d'ail






Figure 26 : Cladodes




Figure 27 : Tige succulente




Figure 28 : rhizome






Figure 29 : Tubercule de pomme de terre



**Figure 30** : Plante acaule



**Figure 31** : rameaux épineux (dards)

### 3/ La feuille

C'est l'organe principal de la photosynthèse, de la respiration et de la transpiration des plantes ; à son niveau se font les échanges entre le végétal et l'atmosphère.

La feuille est formée d'un **limbe** (lame verte au rôle assimilateur) plus ou moins large parcourue par des **nervures**, et d'un **pétiole** étroit le rattachant à la tige, la feuille est dite **sessile** quand elle est dépourvue de pétiole, **embrassante** quand sa base se prolonge en oreillettes de part et d'autre de la tige. La feuille peut être aussi munie d'excroissances de forme variée appelée **stipules**. La feuille se distingue de la tige et de la racine en ce qu'elle est toujours bilatérale dans sa morphologie et dans son anatomie (une partie droite et une gauche, une face supérieure et une face inférieure).




Figure 32 : Morphologie d'une feuille

#### 3-1/ Classification des feuilles

##### 3-1-1/ Forme de limbe

Les feuilles peuvent être classées en deux grandes catégories, **simples** ou **composées**

**3-1-1-1/ Feuille simple** est constituée d'un seul limbe entier, on observe un bourgeon à la base du pétiole. La feuille simple peut être linéaire, spatulée, lancéolée, ovale, arrondie, dentée plus ou moins profondément, crénelé ou lisse....etc.




Figure 33 : Différentes formes d'un limbe





Figure 34 : Différentes forme du bord de limbe

**3-1-1-2/ Feuille composée** est constituée de plusieurs folioles c'est-à-dire elle est découpée en plusieurs petites feuilles, on n'observe pas de bourgeons à la base de ces folioles, le bourgeon se trouve à la base du pétiole.



**Figure 35** : Morphologie d'une feuille simple et composée

Les feuilles composées peuvent avoir leurs folioles de part et d'autre du pétiole principal :

\***Feuilles pennée** : **paripennée** si le nombre de folioles est pair, **imparipennée** si le nombre de folioles est impair.

\*Feuille doublement composée ; **bipennée** si les folioles sont composées de foliolules, et **tripennée** si les folioles sont elles-mêmes composées

\* **Feuilles composées palmées** : les folioles peuvent partir du même point

\***Feuille composée trifoliées** s'il y a trois folioles

\***Feuille composée pédalée** : feuille d'aspect palmé dont les segments latéraux sont le plus souvent plus petits et divergent vers le bas.

Les feuilles des Angiospermes peuvent aussi subir des modifications variées pour assurer certaines fonctions particulières. Le primordium foliaire peut se différencier en vrilles ou en épines.




Figure 36 : Feuille composée paripennée




Figure 37 : Feuille composée imparipennée




Figure 38 : Feuille composée bipennée




Figure 39 : Feuille composée palmée




Figure 40 : Feuille composées pédalée




Figure 41 : Feuille composée trifoliées

### **3-1-2/ Nervation**

Le limbe est parcouru par des nervures assurant la conduction de la sève on distingue en général une nervure principale correspondant au prolongement directes des faisceaux conducteurs du pétiole et des nervures secondaires qui vont en diminuant de diamètre depuis la base de la feuille jusqu'à ses bords


**3-1-2-1/ Nervation pennée** : elle est formée par une nervure principale, portant des nervures secondaires, ces dernières se ramifient en nervures plus fines formant un réseau plus réticulé. La feuille qui présente cette nervation est dite feuille simple pennée si son limbe est simple ou feuille composée pennée si son limbe est composé.

**3-1-2-2/ Nervation palmée** : cette nervation ne présente pas de nervures principales mais plusieurs nervures qui divergent de la base du limbe. Celles-ci se ramifient en nervures secondaires qui à leur tour se ramifient en nervures plus fines formant un réseau.


**3-1-2-3/ Uni nervation (nervure unique)** : feuille qui n'a qu'une seule nervure ex : romarin

**3-1-2-4/ Nervation parallèle** : les nervures parcourent le limbe parallèlement les unes aux autres. Se rencontre principalement chez les Monocotylédones. Ex : blé, orge.....etc.

**3-1-2-5/ Nervation pédalée** : présente trois nervures qui rayonnent à partir d'un même point. Sur les deux nervures latérales partent des ramifications toujours orientées vers le bas de la feuille.



**Figure 42** : Nervation pennée



**Figure 43** : feuille de nervation pennée




Figure 44 : Nervation palmée




Figure 45 : Feuille de nervation palmée




Figure 46 : Nervation pédalée




Figure 47 : Feuille de nervation pédalée




Figure 48 : Feuille de nervation parallèle




Figure 49 : Feuille uninerve



### 3-1-3/ Phyllotaxie

C'est la disposition des feuilles le long d'une plante. Les feuilles de la même espèce sont disposées de la même manière. On distingue ainsi par exemple :

**3-1-3-1/ Feuilles alternes** : fixées isolément à des niveaux différents, sur deux, trois, ou cinq rangs parallèles, verticaux ou spiralés. (Une feuille par nœud) Ex : chêne.

**3-1-3-2/ Feuilles opposées** : disposées par deux, l'une en face de l'autre, à un même niveau de la tige. (Deux feuilles portées par un même nœud). Ex : lamiacées.

**3-1-3-3/ Feuilles verticillées** : feuilles disposées par trois ou plus de trois à chaque niveau. Plusieurs feuilles. (Trois et plus portées par le même nœud). Ex ; laurier-rose.




Figure 50 : Différentes dispositions des feuilles sur une plante (alterne, opposée, verticillée)

### 3-1-4/ Pétiole

Partie rétrécie de la feuille qui unit le limbe à la tige. A sa base se trouve parfois des stipules. Le pétiole est parcouru par les tissus conducteurs qui irriguent le limbe au niveau des nervures. Les feuilles dépourvues de pétioles sont dites **sessiles**. Lorsque le pétiole est élargi jusqu'à remplacer la feuille dans sa fonction on parle de **phyllode**. Le pétiole peut être élargi à sa base pour former **une gaine**.




Figure 51 : Mode d'insertion des feuilles sur la tige

### 3-2/ Parties accessoires des feuilles

#### 3-2-1/ Stipules

Appendice foliacé, au nombre de deux, en forme de feuilles réduites situées de part et d'autre du pétiole, à sa base, au point d'insertion sur la tige.

#### 3-2-2/ Gaine

Chez certaines espèces, la gaine unit le limbe ou le pétiole à la tige. Elle constitue la partie basale élargie de la feuille qui entoure plus ou moins complètement la tige sur une longueur variable. Elle prend différentes formes suivant les espèces. Chez les ombellifères, elle est particulièrement importante. Dans d'autres cas, elle est absente et le pétiole s'insère directement sur la tige.




Figure 52 : Exemples de gaines

**3-2-3/ Ochréa** : gaine membraneuse formée par les stipules soudées et entourant la tige au-dessus de l'insertion du pétiole.

**3-2-4/ Ligule** : sorte de petite languette membraneuse à la face supérieure des graminées.




Figure 53 : Accessoires d'une feuille

### 3-3/ Adaptations morphologiques des feuilles

Pour leur forme et leur organisation, les feuilles sont essentiellement adaptées à certaines fonctions de nutrition, de protection ou de réserve.

#### 3-3-1/ A la fonction de nutrition

**Les vrilles** : issues de la transformation totale du limbe permet au végétal de grimper en s'enroulant autour d'un support pour aller chercher la lumière.

**Les phyllodes** : sont des pétioles aplatis, ressemblant morphologiquement aux feuilles, ils interviennent dans l'assimilation chlorophyllienne à la place des feuilles qui sont très réduites.





Figure 54 : Feuilles adaptées en vrilles Figure 55 : Feuilles adaptées en phylode

#### 3-3-2/ A la fonction de protection

**Feuilles épineuses** : transformées en parties ou totalement en épines empêchant la déshydratation de la plante en saison sèche.



**Figure 56** : Exemples des feuilles épineuses

### **3-3-3/ A la fonction de réserve**

Certaines feuilles s'hypertrophient en accumulant des substances de réserve, elles sont dites feuilles charnues. Ex : réserve d'eau dans les feuilles d'Aloé, réserve de glucides dans les écailles du bulbe d'ail ou d'oignon.

## **4/ Fleur**

Une fleur est un ensemble des organes assurant la reproduction des Angiospermes. Une fleur est constituée d'un axe prenant naissance à l'aisselle d'une feuille. La partie inférieure de cet axe représente le **pédoncule** de la fleur dont l'extrémité plus ou moins renflée constitue le **réceptacle** florale à la base duquel peut s'insérer une bractée. Sur ce réceptacle sont insérées les différentes pièces florales.

Une fleur peut être **hermaphrodite** et contenir à la fois organes mâles (**étamines**) et femelles (**carpelles**), ou seulement mâles ou femelles (**fleur unisexuée ; fleur mâle ou femelle**).

Une fleur est **dioïque**, si chaque individu ne porte que des fleurs mâles ou femelles, la fleur est **monoïque**, si chaque individu porte à la fois des fleurs mâles et femelles.

De l'extérieur vers l'intérieur d'une fleur hermaphrodite, on distingue généralement quatre types de pièces florales souvent regroupés en verticilles sur le réceptacle floral :

\*Deux ensembles de pièces stériles ou enveloppes florales formant **le périanthe** :

A/ **Calice** constitué de **sépales** généralement chlorophylliens, destinés à protéger la fleur ;

B/ **Corolle** constitué de **pétales** généralement vivement colorés dont le rôle est d'attirer les animaux pollinisateurs qui sont pour la plupart des insectes. Chez les dicotylédones, certaines fleurs sont dépourvues de pétales (**apétales**), d'autres sont à pétales séparés (**dialypétales**) et d'autres enfin à pétales soudés entre eux (**gamopétales**) ;

\*Deux ensembles de pièces fertiles directement impliqués dans les phénomènes de reproduction.

A/ **Androcée** constitué par l'ensemble des étamines ;

B/ **Gynécée** ou pistil constitué par l'ensemble des carpelles libres ou soudés entre eux, au centre de la fleur.




Figure 57 : Coupe longitudinale d'une fleur hermaphrodite

#### 4-1/ Péricarpe

Ensemble des enveloppes florales : calice+corolle, qui forme la partie stérile de la fleur. Les caractéristiques du péricarpe sont souvent en rapport étroit avec le type de pollinisation. Chez les plantes **anémophiles**, les pièces péricarpaires, lorsqu'elles existent, sont souvent réduites, ne gênant pas le transport du pollen vers les organes reproducteurs de la fleur. Chez les plantes **entomophiles**, les fleurs ont des pièces péricarpaires plus grandes, de couleur vive avec souvent un parfum attractif.

Lorsque les pièces péricarpaires ne sont pas différenciées en pétales et sépales, on les nomme **tépales** (quand les sépales et les pétales sont de forme et de coloration identiques). Le péricarpe peut être **persistant** ou **caduc**, accrescent (se dit d'une partie de la fleur qui continue sa croissance après la fécondation) ou non. Le nombre des pièces péricarpaires (fleurs trimères, tétramères, pentamères ou polymère), leur formes, leurs relations (libres ou soudées), leur symétrie (par rapport à un axe ou un plan), sont autant de caractères utilisés en systématique.


##### 4-1-1/ Calice

Enveloppe extérieure de la fleur, généralement de couleur verte, recouvrant le plus souvent la base de la corolle et constitué par l'ensemble des sépales. Ces derniers peuvent être libres

jusqu'à la base (**calice dialysépale**) ou plus ou moins soudés entre eux (**calice gamosépale**). Dans certaines fleurs, le calice est coloré comme les pétales, on parle alors de sépales **pétaloïdes** ou de **tépales**.

#### 4-1-2/ Corolle

Ensemble formé par les pétales d'une fleur. Généralement colorée, non chlorophyllienne. La corolle a pour fonction d'attirer les insectes pollinisateurs. Elle est persistante ou caduc. Les pétales peuvent être libres (**corolle dialypétale**) ou plus ou moins soudés entre eux (**calice gamopétale**).



**Figure 58** : Soudures des pièces des périanthes ((a) dialysépale, (b) gamosépale, (c) dialypétale, (d) gamopétale).

Ainsi pour des variations au niveau du périanthe on distingue aussi :

\***Fleur actinomorphe**, quand elle est régulière c'est-à-dire quand elle présente une symétrie radiale (par rapport à un axe).

\***Fleur zygomorphe**, quand elle est irrégulière et présente un plan de symétrie (par rapport à un plan).

\***Fleur asymétrique**, quand elle est dépourvue de tout plan de symétrie.






Figure 59 : Symétrie des fleurs ((a) actinomorphe, (b) zygomorphe)

## 4-2/ Pièces reproductrices

### 4-2-1/ Androcées

Ensemble des étamines, constituant la partie mâle d'une fleur d'Angiospermes. L'étamine est considérée comme l'organe mâle d'une fleur, porté par le réceptacle floral et placé entre la corolle et le pistil. Une étamine est généralement formée d'une partie allongée et grêle appelée **filet** terminé par une partie renflée appelée anthère. Celle-ci est le lieu de production des grains de pollen (gamétophyte mâle), dans des cavités appelées sacs polliniques (microsporanges), généralement au nombre de quatre, souvent fusionnées en deux loges séparées par un connectif. Les étamines dont l'ensemble constitue l'**androcée**, peuvent être libres jusqu'à la base ou plus ou moins soudées entre elles ou aux autres parties de la fleur (pétales, pistil). Les fleurs qui n'ont que des étamines sans pistil sont appelées fleurs staminées. A maturité l'anthère s'ouvre et laisse échapper le pollen, qui permet la fécondation.




Figure 60 : Structure d'une étamine




Figure 61 : Coupe transversale d'une anthère jeune et mûre

#### 4-2-2/ Gynécée

**Ensemble des carpelles** constituant la partie femelle d'une fleur, ordinairement situés au centre de celle-ci en spirales ou en verticille. Un carpelle est composé de trois parties ; **ovaire**, **style** (colonne reliant l'ovaire aux stigmates) et **stigmate** (situé à l'extrémité du style, adaptée à la réception des graines de pollen). Les carpelles peuvent être libres entre eux (**gynécée dialycarpe ou apocarpe**) ou soudés (**gynécée gamocarpe ou syncarpe**). Dans le premier cas et à la base du gynécée, se trouvent **les ovaires**; dans le deuxième cas, un **ovaire composé** formé par la réunion des ovaires de chaque carpelle. Les fleurs n'ayant que le gynécée et pas d'étamines, sont dites **fleurs pistillées** ou **fleurs femelles**.





Figure 62 : Différents types de carpelles (1) ovaires styles et stigmates soudés (2) ovaires et styles soudés (3) ovaires soudés, styles et stigmates libres.

L'ovaire d'une fleur est la partie basale, creuse et renflée du pistil (ou gynécée), correspondant à un ou plusieurs carpelles et renfermant un ou plusieurs **ovules**. Après fécondation et maturation, **les ovules** se transforment en **graines** et **l'ovaire** en **fruit**. On distingue trois types principaux d'ovules chez les Angiospermes, selon leur orientation par rapport à leur point d'insertion sur le carpelle : **ovules orthotropes** (droits), **ovules campylotropes** (courbés) ou **ovules anatropes** (renversés).




**Figure 63** : Différents types des ovules

**La placentation** définit la position des ovules à l'intérieur de l'ovaire. Celle-ci est très variable. Il est possible de les regrouper en quatre grands types, il s'agit de :

\***Placentation axiale** : les ovules sont fixés au centre d'un ovaire formé de plusieurs loges

\***Placentation pariétale** : les ovules sont insérés sur la paroi périphérique d'un ovaire non compartimenté

\***Placentation centrale** : dans un ovaire uniloculaire provenant de la soudure de plusieurs carpelles fermés dont les cloisons se sont résorbées seule reste une colonne centrale sur laquelle sont fixés les ovules.




**Figure 64** : Différents types de placentation (A) placentation axile, (B) placentation pariétale, (C) placentation centrale.

La disposition des ovaires et des pièces florales montre trois cas :

\***Hypogyne** : se dit d'une fleur dont les pièces florales (sépales, pétales et étamines) sont insérés au dessous de l'ovaire qui est dit **supère**.

\***Epigyne** : se dit des organes (étamines, enveloppes florales) d'une fleur à ovaire infère, situés au-dessus du gynécée

\***Périgyne** : se dit d'une fleur dont les enveloppes florales et l'androcée sont insérés autour de l'ovaire semi-infère, libre au fond du réceptacle creux.



**Figure 65** : Disposition des ovaires et pièces florales ; hypogyne (ovaire supère), épigyne (ovaire semi infère), périgyne (ovaire infère).

### 4-3/ Inflorescence des fleurs

C'est la disposition des fleurs sur la tige d'une plante à fleur, on distingue des **inflorescences définies** (axe principal qui se termine par une fleur) **et indéfinies** (axe principal se termine par un bourgeon et s'allonge), selon que l'axe principal de l'inflorescence est terminé par un bourgeon ou par une fleur. L'inflorescence est considérée comme un moyen d'attraction des pollinisateurs.




Figure 66 : Exemples d'inflorescences définies




Figure 67 : Exemples d'inflorescences indéfinies

Un type d'inflorescence particulier est celui en **capitule** dans lequel de petites fleurs sessiles sont insérées les unes à côté des autres sur un support commun ; le **réceptacle** élargi. On peut distinguer deux types de fleurs qui composent le capitule : **fleurs tubulées** (gamopétales

actinomorphes) et **fleurs ligulées** (gamopétales zygomorphe). Il existe des capitules qui sont uniquement composés par les fleurs tubulées, d'autres composés uniquement par des fleurs ligulées ou bien des capitules composés à la fois par des fleurs tubulées (au centre) et ligulées (à la périphérie) (ex : tournesol et margueritte).




Figure 68 : Exemple d'inflorescence en capitule




Figure 69 : Fleur tubulée




Figure 70 : Fleur ligulée