



**COMMENT FAIRE
VOMIR
UN CHIEN
UN CHAT EN SITUATION
D'URGENCE**

BACHTARZI KARINA 2020





LES PRINCIPALES CAUSES D'INTOXICATION CHEZ LE CHIEN


- ❖ Chocolat
- ❖ Raisins
- ❖ Rodenticides
- ❖ Médicaments pour humains
(anti-inflammatoires)
- ❖ Produits chimiques
- ❖ Certaines plantes





CONDITIONS, LIMITES ET INTÉRÊTS

L'intérêt de faire vomir son chien ou son chat est de:





Pour un produit toxique, il ne faut pas dépasser **2 heures** après ingestion pour provoquer un vomissement.
Au delà, cela risque d'être inefficace voir même aggraver l'état de l'animal



LES CONDITIONS OU SITUATIONS OÙ IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PROVOQUER LE VOMISSEMENT :

la nature du produit ingéré : dans le doute , il vaut mieux ne pas faire vomir son animal de compagnie .





LES CONDITIONS OU SITUATIONS OÙ IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PROVOQUER LE VOMISSEMENT

Ingestion d'hydrocarbures ou distillats de pétrole (kérosène, essence, huile de moteur): ce sont des substances grasses qui peuvent facilement être inhalées ou aspirées dans les poumons et provoquer une grave pneumonie.





LES CONDITIONS OU SITUATIONS OÙ IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PROVOQUER LE VOMISSEMENT

Ingestion de produits corrosifs (eau de javel, acides, produits nettoyants de four, pour déboucher les canalisations, soude, produits contenant de la chaux, produits moussants) : ces produits peuvent provoquer ou aggraver des brûlures lors du vomissement provoqué.





LES CONDITIONS OU SITUATIONS OÙ IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PROVOQUER LE VOMISSEMENT

Ingestion d'objets tranchants ou vulnérants :

aiguille, hameçon, plastique pointu, fil, ruban,





LES CONDITIONS OU SITUATIONS OÙ IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PROVOQUER LE VOMISSEMENT

L'animal est inconscient: surtout ne pas provoquer un vomissement sous risque de provoquer une broncho-pneumonie par erreur de lieu ou d'aggraver des troubles neurologiques.





LES CONDITIONS OU SITUATIONS OÙ IL EST FORMELLEMENT
INTERDIT DE PROVOQUER LE VOMISSEMENT

Si l'animal a déjà vomi





LES CONDITIONS OU SITUATIONS OÙ IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PROVOQUER LE VOMISSEMENT

Le temps d'ingestion a dépassé plus de deux heures





LES SITUATIONS OÙ IL EST CONSEILLÉ DE FAIRE VOMIR :

Ingestion récente (moins de deux heures) et on sait la nature du produit ou du corps étranger non traumatisant





LES SITUATIONS OÙ IL EST CONSEILLÉ DE FAIRE VOMIR :

Lorsque l'Animal ne présente aucun symptôme et ne risque pas d'inhaler le vomi

Attention : les chiens avec malformations ou pathologies respiratoires ne sont pas des bons candidats à faire vomir (races brachycéphales, chien avec paralysie du larynx, collapsus trachéal , mégaoesophage)



SYNDROME BRACHYCÉPHALE DU CHIEN

Le mot brachycéphale vient du grec et se divise en deux termes :

"brachy" (*brakhys*) qui signifie "court

et "céphale" (*képhalos*) qui signifie "tête".



Ces chiens, en raison de leur **anatomie**, sont sensibles au **syndrome brachycéphale** du chien, qui entraîne des **problèmes respiratoires** et même une **obstruction** des voies respiratoires, causant une respiration bruyante et même un affaissement.

D'autres caractéristiques des races brachycéphales de chiens sont une mâchoire molle, allongée et charnue, ainsi que des narines étroites, des changements dans le larynx et une petite trachée



RACES DE CHIENS BRACHYCÉPHALES

La liste complète des chiens brachycéphales sont :

- Le Bouledogue anglais
- Le Terrier de Boston
- Le Bouledogue français
- Le Pékinois
- Le Carlin
- Le Lhasa apso
- Le Shar pei
- Le Shih tzu
- Le Cavalier King Charles spaniel
- Le Staffordshire Bull Terrier
- Le Boxer



Le Bouledogue anglais





Le Terrier de Boston





Le Bouledogue français





Le Pékinois





Le Carlin





Le Lhasa apso





Le Shar pei





Le Shih tzu





Le Cavalier King Charles spaniel





Le Staffordshire Bull Terrier





Le Boxer





LES SITUATIONS OÙ IL EST CONSEILLÉ DE FAIRE VOMIR si intervention rapide (2Heures) Après Ingestion de

Chocolat



Raisins



Rodenticides



Médicaments humains nuisibles



les situations où il est conseillé de faire vomir :

ingestion d'antigel : intoxication fréquente car gout sucré , dans les deux heures, faire vomir suivi d'administration de charbon pour limiter l'absorption.



NON !!!



GESTE À NE PAS FAIRE



Mettre les doigts dans la gueule (gorge) de l'animal non seulement cette manipulation est difficile à réaliser et inutile, mais en plus vous risquez de blesser le chien, voir même vous blesser vous même (morsures)



Protocole pour faire vomir un chien ,un chat

On peut utiliser pour faire vomir un chien le **peroxyde d'hydrogène** (eau oxygénée) à 3% (10 vol) surtout pas une concentration plus élevée .

La dose est de 1 à 2 ml par kg de poids vif à donner avec une seringue pour plus de facilité .



Protocole pour faire vomir un chien ,un chat

Pour provoquer des vomissement en utilisant du **sel** il faut

- ❖ Un verre d'eau
- ❖ 1-3 cuillère(s) de sel
- ❖ Une seringue sans pointe



Faire vomir un chien avec du sel :

- ❖ Mélangez l'eau et le sel jusqu'à l'obtention d'une solution homogène
- ❖ Remplissez la seringue avec la solution
- ❖ Ouvrez la gueule de votre chien
- ❖ Videz la seringue rapidement (pour que la solution sorte avec pression) dans la gorge du chien

Patiencez de 10 à 15 mn en gardant un œil sur votre chien
Vous observerez chez votre chien, du mal-être, de la salivation excessive et une envie de se cacher pour aller vomir
Si aucun de ces symptômes ne se produisent durant ce laps de temps, recommencez l'opération



Protocole pour faire vomir un chien ,un chat

Pour Le Chien :

l'apomorphine

A faible dose , cette molécule déclenche des vomissements .

Injection sous cutanée , la dose est de 0,1 mg par kg (1 ampoule de 1 ml en sc par 10 kg) .

Les vomissements sont produits après 2 à 10 minutes après injection



Protocole pour faire vomir un chien ,un chat

La Xylazine

à la dose 0.2mg/kg IV ou 0.45 mg/Kg IM.

Attention

la xylazine est un dépresseur cardio-respiratoire
et
provoque de l'hypotension, de la sédation
et de la salivation



Pour le chat :

Xylazine à la même dose que pour le chien .

Attention : L'apomorphine est contre -indiqué chez le chat ! Pour cette espèce, l'apomorphine provoque des hallucinations et de l'agressivité !

Pour limiter l'absorption du toxique , on peut pratiquer un lavage gastrique ou administrer une solution à base de charbon activé





UTILISATION DU CHARBON

Utilisation du charbon actif. Après le vomissement, votre objectif sera de réduire l'absorption de poison passé dans l'intestin. Pour cela, vous aurez besoin de **charbon actif**.

La dose est de 1 g de poudre sèche pour un demi-kilo de poids. Un chat de taille moyenne aura besoin d'environ 10 g de charbon actif

Dissoudre la poudre dans la plus petite quantité d'eau possible pour former une bouillie épaisse et envoyez-la avec une seringue dans la bouche du chat.

Recommencez toutes les 2 ou 3 heures jusqu'à la 4^{ème} dose



UTILISATION DU CHARBON

Le charbon activé n'est pas absorbé par la muqueuse digestive après administration orale.
il tapisse la paroi digestive et adsorbe les substances indésirables, évitant ainsi leur passage dans le sang

FIN

