

La cysticerose hépato-péritonéale chez les ruminants

Définition

- les larves *Cysticercus tenuicollis* du *Tania hydatigena* se développent au niveau de la face postérieure du foie et de l'épiploon

Les crottes du chien parasitées par des anneaux de ténia, ces anneaux de ténia libèrent des milliers d'œufs; Les œufs contaminent les aliments (herbe) ingérés par les ovins. Adultes ou agneaux de bergerie ou de plein air qui ont ingéré des aliments contaminés par les œufs de ténia des chiens : Viande parasitée par des Larves de ténia ou vésicules hydatiques appelées Cysticerques.

A l'Abattoir

Chez les ovins, la larve du ténia du chien ou vésicule se présente comme une poche de 0,5 à 3 cm de diamètre, constituée d'une très fine membrane translucide remplie d'un liquide incolore. -Elle est attachée à la surface du foie ou d'autres organes abdominaux ou thoraciques (cœur – poumon).

-Dans la vésicule, on peut apercevoir une petite tache blanche unique correspondant à la tête (ou scolex) du futur ténia de l'intestin grêle du chien.

TRAITEMENT

Pas de traitement des vésicules chez le mouton.

PREVENTION

Seule la prévention permet d'éliminer ces maladies parasitaires :

1- Traitement des chiens

Vermifugation régulière des chiens : tous les trois mois dans un troupeau infesté, avec des médicaments à base de Praziquantel (5 mg/kg).

Les chiens doivent être maintenus à l'attache après vermifugation afin de pouvoir détruire les selles et, si possible, baignés pour éliminer les œufs présents sur le pelage.

La destruction des selles évite la dissémination d'œufs sur un pâturage, ou dans le foin, par un chien qui vient d'être vermifugé.

2- Prévenir l'infestation des chiens

- Destruction par incinération des abats parasités.
- Ne jamais nourrir les chiens avec des abats de mouton,
- Interdire aux chiens l'accès aux lieux d'abattage